SERESTO COLLIER CHATS, SERESTO COLLIER PETITS CHIENS, SERESTO COLLIER GRANDS CHIENS collier. **Composition :** imidaclopride 1 g, fluméthrine 0,45 g, dioxyde de titane (E171), oxyde de fer noir (E172), excipient qsp 10 g de collier. **Indications :** Chez les chats et les chiens, traitement et prévention des infestations par les puces (*Ctenocephalides felis*) pendant 7 à 8 mois. L'efficacité contre les puces commence dès l'application du collier. Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP). Le médicament protège l'environnement immédiat de l'animal contre le développement de larves de puces pendant 10 semaines chez le chat et 8 mois chez le chien. Le produit exerce une action acaricide (chez le chien *: Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus* ; chez le chat, *Ixodes ricinus*, Rhipicephalus *turanicus*) et une action répulsive contre les infestations par les tiques (chez le chien *: Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus* ; chez le chat : *Ixodes ricinus*) durant 8 mois. Il est efficace contre les larves, les nymphes et les tiques adultes. Chez le chien, traitement de l'infestation par les poux broyeurs (*Trichodectes canis*). **Posologie :** Usage cutané. Un collier par animal, à fixer autour du cou. Application externe uniquement. Le collier doit être porté sans interruption durant la période de protection de 8 mois et enlevé à l'issue de cette période. Pour le détail du mode d'emploi, se référer à la notice. **Contre-indications :** Ne pas traiter les chatons âgés de moins de 10 semaines, les chiots âgés de moins de 7 semaines. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue aux substances actives ou à l'un des excipients. **Effets indésirables :** Occasionnellement, de légers troubles comportementaux pouvant inclure un grattage au site d'application, peuvent être observés chez les animaux non habitués à porter des colliers, durant les premiers jours qui suivent sa mise en place. Veiller à ce que le collier ne soit pas trop serré. De légères réactions au site d'application comme un prurit, un érythème, une perte de poils, peuvent survenir. Ces réactions ont rarement été reportées chez le chien et peu fréquemment chez le chat et disparaissent habituellement en 1 ou 2 semaines sans avoir à retirer le collier. Dans certains cas, un retrait temporaire du collier peut être recommandé jusqu'à la disparition des symptômes. Dans de très rares cas chez le chien et de rares cas chez le chat, des réactions au site d'application telles que dermatite, inflammation, eczéma ou lésions peuvent survenir et dans ces cas, il est recommandé de retirer le collier. Chez le chat, dans de rares cas, des réactions légères et transitoires comme la dépression, le changement de prise alimentaire, salivation, vomissement et diarrhée peuvent survenir au début. Comme avec d'autres applications topiques, des dermatites allergiques de contact peuvent survenir chez des animaux hypersensibles. **Précautions particulières d'emploi : Chez les animaux :** Le produit est résistant à l'eau ; il reste efficace si l'animal est mouillé. Toutefois, il convient d'éviter une exposition prolongée et intense à l'eau ou un shampouinage intensif car la durée d'activité du produit pourrait s'en trouver réduite. Des études démontrent qu'une immersion dans de l'eau ou un shampooing mensuel ne raccourcit pas de manière significative la durée d'efficacité de 8 mois contre les tiques après relargage des substances actives sur le pelage, tandis que l'efficacité contre les puces diminue progressivement à partir du 5ème mois. **Pour l'utilisateur :** Conserver le sachet contenant le collier dans sa boîte jusqu'à son utilisation. Comme pour tout médicament vétérinaire, ne pas autoriser les jeunes enfants à jouer avec le collier ni à les mettre dans leur bouche. Les animaux portant le collier ne doivent pas être autorisés à dormir dans le même lit que leurs propriétaires, surtout les enfants. Les personnes ayant une hypersensibilité connue aux ingrédients du collier devront éviter tout contact direct avec celui-ci. Eliminer immédiatement tous restes ou chutes du collier (voir rubrique « Posologie et voie d'administration »). Se laver les mains à l'eau froide après la mise en place du collier. **Lire attentivement la notice avant utilisation**. **Catégorie :** Usage vétérinaire. **Présentations :** Seresto collier chats AMM n° FR/V/1111378 0/2011, Seresto collier petits chiens, AMM n° FR/V/4497071 2/2011, Seresto collier grands chiens AMM n° FR/V/7403801 3/2011. **Fabriqué par** KVP Kiel, Allemagne. **Titulaire d'AMM :** Bayer HealthCare - 220, avenue de la Recherche 59120 Loos 706 580 149 RCS LILLE METROPOLE. **Exploitant :** Bayer HealthCare Division Animal Health – 13 rue Jean Jaurès 92807 Puteaux Cedex. v01/2014